



# Ficha Técnica HERBICIDAS



## ATRAZINA 500 SC DIABLO

Atrazina

Herbicida

Suspensión concentrada

Triazinas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  
RSCO-HEDE-0204-258-064-45

DISTRIBUIDO POR:  
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
------------------------	---------

**Ingrediente Activo.**

**Atrazina**

(6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3-5-triazina-2,4-diamina  
(Equivalente a 500 g de i.a./l a 20°C

45.00

**Ingredientes Inertes.**

Emulsificante, antiespumante, anticongelante, espesante antiséptico, estabilizador, agua

55.00

**TOTAL** 100.00

**MODO DE ACCIÓN.**

ATRAZINA 500 SC DIABLO es un herbicida formulado como suspensión concentrada. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza de hoja ancha y angosta





# Ficha Técnica HERBICIDAS



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo (SL)	Aceitilla ( <i>Bidens pilosa</i> ) Quelite ( <i>Amaranthus hibridus</i> ) Zacate cadillo ( <i>Cenchrus equinatus</i> ) Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> )	2.0 – 4.0	Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo.
	Hierba golondrina ( <i>Euphorbia hirta</i> )	3.0 - 4.0	

## TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

(**I**) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APlicAR EL PRODUCTO.

Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Para preparar el producto, vacíe la dosis recomendada de **ATRAZINA 500 SC DIABLO** en el tanque de mezclado o del equipo, conteniendo las ¾ partes del volumen de agua requerido para lograr una buena cobertura, agite y posteriormente agregue el agua faltante. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para mantener uniforme la suspensión. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 200 a 400 litros de agua por ha. Use el equipo de protección overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla

Como la acción del producto depende de la humedad del suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.

En aplicación pre-emergente: aplique **ATRAZINA 500 SC DIABLO** en los días que sigue a la siembra, antes de que nazca la maleza y el cultivo. El suelo deberá estar bien mullido y húmedo. La maleza emerge, se forman las primeras hojas, se amarillean y mueren dentro de los 5 a 10 días posteriores a la aplicación.

## CONTRAINDICACIONES.

En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 3 L/ha de **ATRAZINA 500 SC DIABLO** para evitar residuos en el suelo. Los campos tratados con **ATRAZINA 500 SC DIABLO** no deben sembrarse con cultivos susceptibles hasta transcurridos de 4 a 6 meses. Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa, haba y trigo. No deberá sembrarse alfalfa o donde se siembre cultivos asociados.

## INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **ATRAZINA 500 SC DIABLO**, en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previo a la aplicación”





# Ficha Técnica HERBICIDAS



## MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOxicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

