



Ficha Técnica INSECTICIDAS



HORTA 25 TRIDENTE

Diazinon

Insecticida / Acaricida

Concentrado Emulsionable

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-INAC-0120-007-009-025

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DIAZINON.

0,0-Dietil 0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidinil)fosforotioato

Equivalente a 30 g de I.A/L

25

Ingredientes Inertes.

Diluyente, emulsificantes y compuestos relacionados

75

TOTAL 100.00





Ficha Técnica INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación. Lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Cultivo	Plagas Nombre común (Nombre científico)	Dosis (L/ha)
Alfalfa (0)	Pulgón manchado (<i>Terioaphis maculata</i>); Pulgón del chícharo (<i>Acyrthosiphon pisum</i>); Chicharrita (<i>Aceratagallia curvata</i>)	1.0-1.5
Fresa (5)	Araña ciclamina (<i>Steneotarsonemus pallidus</i>); Pulgón (<i>Pentatrichopus spp</i>); Mosquita blanca (<i>Trialeurodes spp</i>).	
Frijol (7)	Picudo de ejote (<i>Apion godmani</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>); Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0-1.5
Cacahuate (28)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Doradilla (<i>Diabrotica spp</i>); Trips (<i>Frankliniella spp</i>)	
Soya (7)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Chinche ligus (<i>Ligus spp</i>); Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>); Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	
Melón (3) Sandía (3) Calabaza (7) Pepino (3)	Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Pulgón del algodón y melón (<i>Aphis gossypii</i>); Pulga saltona negra (<i>Epitrix spp</i>).	
Cebolla (10)	Trips (<i>Thrips tabaco</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>); Gusano de la cebolla (<i>Hylemia antiqua</i>); Chinche ligus (<i>Ligus spp</i>)	1.0-1.5
Jitomate (1)	Minador serpentina (<i>Liriomyza munda</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>); Doradilla (<i>Diabrotica spp</i>); Pulga negra (<i>Halticus spp</i>); Chicharrita del betabel (<i>Eutettix tenellus</i>); Trips (<i>Frankliniella spp</i>).	
Chile (5)	Pulga saltona (<i>Epititrix spp</i>); Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp</i>).	
Chícharo (21)	Trips (<i>Frankliniella spp</i>); Minador serpentina de la hoja (<i>Liriomyza pusilla</i>);	





Ficha Técnica INSECTICIDAS



	Pulgón del chícharo (<i>Acyrthosiphon pisum</i>); Araña roja (<i>Tetranychus spp.</i>)	
Ciruelo (20)	Escama de San José (<i>Quadrapsidiotus perniciosus</i>); Frailecillo (<i>Macrodactylus spp.</i>)	150-200 ml en 100 L de agua
Manzano (14)	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>); Escama de San José (<i>Quadrapsidiotus perniciosus</i>); Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>)	
Durazno (21)	Escama de San José (<i>Quadrapsidiotus perniciosus</i>)	

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas después de la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Se puede repetir la aplicación con intervalos de 5 a 7 días hasta un control total de la infestación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Mezclar la dosis de **HORTA 25 TRIDENTE** en la cantidad necesaria de agua limpia, para cubrir una hectárea. Para aplicaciones en pequeñas superficies o en frutales, diluir 150 ml en 100 L de agua y bañe con esta emulsión el follaje de las plantas atacadas.

CONTRAINDICACIONES.

Hacer las aplicaciones cuando no soplen vientos fuertes y asegurar que no haya una contaminación de cultivos vecinos.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar **HORTA 25 TRIDENTE** con productos de reacción alcalina, ni metamidofos, triclorfom, maneb y zineb.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE CONFORME A LA COMPOSICIÓN PORCENTUAL ESPECIFICADA EN LA PRESENTE ETIQUETA. EL BUEN USO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS QUEDAN FUERAN DE NUESTRO ALCANCE, POR LO QUE SON RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO USA Y LO RECOMIENDA.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOxicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

